

# Vacunas recomendadas por edad (desde el nacimiento hasta los 18 años)

Use esta tabla para aprender qué vacunas se necesitan y cuándo. Hable con su proveedor de atención médica sobre las vacunas para su hijo.

	Nacimiento	1 mes	2 meses	4 meses	6 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	A los 19-23 meses	De 2 a 3 años	De 4 a 6 años	De 11 a 12 años	De 13 a 15 años	16 años	De 17 a 18 años	
COVID-19	Vacunación basada en la toma de decisiones clínicas compartidas																
DTaP		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3			Dosis 4				Dosis 5						
Gripe	De 1 a 2 dosis al año												1 dosis al año				
Hep A	Serie de 2 dosis, con 6 meses de diferencia																
Hep B	Dosis 1	Dosis 2		Dosis 3													
Hib		Dosis 1	Dosis 2		Dosis 3												
HPV													Ver notas*				
IPV		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3								Dosis 4					
MenACWY													Dosis 1		Dosis 2		
MMR							Dosis 1				Dosis 2						
PCV		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3		Dosis 4											
RSV	Dosis 1																
RV		Dosis 1	Dosis 2														
Tdap													Dosis 1				
VAR							Dosis 1				Dosis 2						

Fuente: CDC. "Vaccine Schedules." 11/22/24 [cdc.gov/vaccines/imz-schedules](https://www.cdc.gov/vaccines/imz-schedules)

\* Se recomienda la vacunación contra el HPV de forma rutinaria entre los 11 y los 12 años (puede comenzar a los 9 años) y se recomienda la vacunación contra el HPV de refuerzo para todas las personas hasta los 18 años si no están vacunadas adecuadamente.

† La protección contra el RSV ahora incluye la vacunación materna contra el RSV durante el embarazo o la inmunización infantil con anticuerpos monoclonales (nirsevimab).

## La vacuna contra la COVID-19 protege contra el coronavirus

Los síntomas del **coronavirus** pueden ser leves o graves. **Signos:** Fiebre, dolores corporales, dolor de garganta, tos, cansancio, secreción nasal, pérdida reciente del gusto o del olfato.

## La vacuna DTaP protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina

La **difteria** puede causar inflamación o insuficiencia cardíaca, coma, parálisis (incapacidad para mover partes del cuerpo) y la muerte. **Signos:** Dolor de garganta, fiebre, ganglios inflamados, debilidad.

El **tétanos** puede causar la fractura de los huesos, dificultad para respirar y la muerte. **Signos:** Rigidez en el cuello y el estómago, dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre.

La **tos ferina** puede causar infección pulmonar y la muerte. **Signos:** Tos fuerte, secreción nasal, dificultad para respirar.

## La vacuna antigripal protege contra la influenza (gripe)

La **gripe** puede causar una infección pulmonar. **Signos:** Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, cansancio.

## La vacuna HepA protege contra la hepatitis A.

La **hepatitis A** puede causar insuficiencia hepática, dolor en las articulaciones y trastornos renales, pancreáticos y sanguíneos. **Signos:** Fiebre, dolor de estómago, falta de apetito/hambre, vómitos, coloración amarillenta de la piel/ojos, orina oscura, cansancio.

## La vacuna HepB protege contra la hepatitis B.

La **hepatitis B** puede causar infección hepática a largo plazo, insuficiencia hepática y cáncer. **Signos:** Fiebre, dolor de cabeza, debilidad, dolor en las articulaciones, vómitos, coloración amarillenta de la piel/ojos o ausencia de signos.

## La vacuna Hib protege contra la Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

La **Hib** puede causar infecciones cerebrales, de la médula espinal, de la epiglotis y de los pulmones, problemas de aprendizaje y la muerte. **Signos:** Es posible que no presente signos a menos que las bacterias entren en la sangre.

## La vacuna contra el HPV protege contra el virus del papiloma humano (HPV)

El **HPV** puede causar cáncer de cuello uterino, de la vagina, de la vulva, del pene, del ano y de la garganta. **Signos:** Verrugas genitales o ausencia de signos.

## La vacuna IPV protege contra la poliomielitis

La **poliomielitis** puede causar parálisis (incapacidad para mover parte del cuerpo) y la muerte. **Signos:** Dolor de garganta, fiebre, náuseas, dolor de cabeza o ausencia de signos.

## Las vacunas MenACWY y MenB protegen contra el meningococo

El **meningococo** puede causar pérdida de extremidades, sordera (pérdida de la audición), trastornos del sistema nervioso como discapacidades del desarrollo, convulsiones, accidentes cerebrovasculares y la muerte. **Signos:** Fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, sarpullido.

## La vacuna MMR protege contra el sarampión

El **sarampión** puede causar inflamación del cerebro, infección pulmonar y la muerte. **Signos:** Sarpullido, fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis. Las **paperas** pueden causar infección del cerebro/médula espinal, inflamación del cerebro, inflamación de los testículos/ovarios y sordera (pérdida de la audición). **Signos:** Ganglios salivales inflamados, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular.

La **rubéola** puede causar problemas en las mujeres embarazadas, como aborto espontáneo, muerte fetal (el nacimiento de un bebé que ha muerto en el útero), parto prematuro y defectos congénitos.

**Signos:** Sarpullido, fiebre, ganglios inflamados.

## La vacuna PCV13 protege contra el neumococo

El **neumococo** puede causar infecciones de la sangre, el cerebro, la médula espinal y la muerte. **Signos:** Infección pulmonar o ausencia de signos.

## La vacuna contra el RSV protege contra el virus respiratorio sincitial (RSV)†

El **rotavirus**, por lo general, causa síntomas leves, parecidos a los del resfriado, pero pueden ser graves. **Signos:** Secreción nasal, tos, fiebre, sibilancias, apnea (pausas en la respiración durante más de 10 segundos), irritabilidad.

## La vacuna contra el RV protege contra el rotavirus.

El **rotavirus** puede causar diarrea grave y deshidratación. **Signos:** Fiebre, vómitos.

## La vacuna Tdap protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (ver vacuna DTaP)

## La vacuna VAR protege contra la varicela

La **varicela** puede causar ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, inflamación del cerebro e infección pulmonar. **Signos:** Cansancio, sarpullido, dolor de cabeza, fiebre.

Aetna cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo.

**ENGLISH:** ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call the number on the back of your ID card or **1-800-385-4104 (TTY: 711)**.

**SPANISH:** ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al **1-800-385-4104 (TTY: 711)**.

**CHINESE:** 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電您的 ID 卡背面的電話號碼或 **1-800-385-4104 (TTY: 711)**。

UPDATED NOV19  
NJ-26-01-03 | 097-25-92



Las vacunas son un beneficio cubierto y sin costo para los miembros de Aetna Better Health® of New Jersey.



Aetna Better Health® of New Jersey